


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 08

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

16/09/2023 - 22/09/2023



COMPENSORIO - ABRUZZO COLLINA INTERNA

ARCHI	ALANNO
ATESSA	CASTIGLIONE A CASAURIA
BUCCHIANICO	CATIGNANO
CASOLI	CIVITAQUANA
CHIETI	CIVITELLA CASANOVA
CUPELLO	CORVARA
SANT EUSANIO DEL SANGRO	CUGNOLI
VILLAMAGNA	MONTEBELLO DI BERTONA
BALSORANO	TOCCO DA CASAURIA
SAN VINCENZO VALLE ROVETO	BELLANTE

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	4	1	5%	STAZIONARIO	BASSO

PREVISIONI METEO

						
15/09/2023	16/09/2023	17/09/2023	18/09/2023	19/09/2023	20/09/2023	21/09/2023

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Catture sulle trappole a feromone stabili. Infestazione (presenza di uova o larve attive di I o II età) presente ed in alcuni casi oltre la soglia d'intervento (3-5%). Consigliamo nel caso di intervenire con prodotti a base di Acetamiprid (intervallo di sicurezza 21 gg) o Flupyradifurone (intervallo di sicurezza 14 gg). Per le coltivazioni Biologiche, si può intervenire con prodotti a base di Spinosad o è possibile ancora posizionare esche proteiche o trappole Attract & Kill.

Dopo il trattamento specifico, nel caso in cui si intenda iniziare la raccolta delle olive oltre la prima quindicina di ottobre è consigliabile, a prevenzione di un nuovo attacco, intervenire con un trattamento a copertura meccanica, con prodotti a base di caolino (es. Manisol).

Per qualsiasi dubbi, chiarimenti ed analisi delle olive, contattare i tecnici della cooperativa.