


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2
PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO
27/06/2025 - 04/07/2025



**COMPENSORIO - ABRUZZO PRIMA
COLLINA LITORANEA**

MONTEODORISIO
PAGLIETA
POLLUTRI
RIPA TEATINA
TORREVECCHIA TEATINA
CEPAGATTI
COLLECORVINO
ELICE
LORETO APRUTINO
MOSCUFO
PENNE
PIANELLA
ROSCIANO
MORRO D ORO
MOSCIANO SANT ANGELO
NOTARESCO
SANT Omero

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	152	8	10%	PEGGIORAMENTO	MEDIO

PREVISIONI METEO

27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le catture rilevate dalle trappole a feromone risultano di entità medio-alta. In alcuni areali si registra un livello di infestazione (presenza di uova e/o larve) intorno al 10%, (il valore che rappresenta la soglia di intervento consigliata per il controllo della Tignola dell'olivo è pari al 10%).

Si raccomanda, pertanto, di procedere con un trattamento fitosanitario impiegando Bacillus thuringiensis (BIOLOGICO) o Azadiractina o Acetamiprid (MAX 2 TRATTAMENTI L'ANNO).

In caso di incertezza sull'effettiva entità dell'infestazione, è possibile consegnare ai tecnici un campione costituito da 50-100 olive complete di peduncolo, per una valutazione più approfondita.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si invita a contattare i tecnici di riferimento.