


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 2

PERIODO DI VALIDITA':

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

27/06/2025 - 04/07/2025



COMPENSORIO - ABRUZZO - ZONA COSTIERA

CASALBORDINO
FOSSACESIA
ROCCA SAN GIOVANNI
SAN VITO CHIETINO
TORINO DI SANGRO
VILLALFONSINA
CITTA SANT ANGELO
MONTESILVANO
GIULIANOVA
ROSETO DEGLI ABRUZZI
TORTORETO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
ACCRESIMENTO FRUTTI	300	12	10%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

27/06/2025	28/06/2025	29/06/2025	30/06/2025	01/07/2025	02/07/2025	03/07/2025

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le catture rilevate dalle trappole a feromone risultano di entità medio-alta. In alcuni areali si registra un livello di infestazione (presenza di uova e/o larve) superiore al 10%, (il valore che rappresenta la soglia di intervento consigliata per il controllo della Tignola dell'olivo è pari al 10%).

Si raccomanda, pertanto, di procedere con un trattamento fitosanitario impiegando *Bacillus thuringiensis* (BIOLOGICO) o Azadiractina o Acetamiprid (MAX 2 TRATTAMENTI L'ANNO).

In caso di incertezza sull'effettiva entità dell'infestazione, è possibile consegnare ai tecnici un campione costituito da 50-100 olive complete di peduncolo, per una valutazione più approfondita.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si invita a contattare i tecnici di riferimento.