

BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 03

MONITORAGGIO MOSCA DELLE OLIVE

PERIODO DI VALIDITA':

31/07/2026 - 07/08/2026



COMPRENSORIO - ABRUZZO - ZONA COSTIERA

CASALBORDINO
FOSSACESIA
ROCCA SAN GIOVANNI
SAN VITO CHIETINO
TORINO DI SANGRO
VILLALFONSINA
CITTA SANT ANGELO
MONTESILVANO
GIULIANOVA
ROSETO DEGLI ABRUZZI

TORTORETO

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INGROSSAMENTO FRUTTI	5	4	5%	PEGGIORAMENTO	ALTO

PREVISIONI METEO

						
31/07/2026	01/08/2026	02/08/2026	03/08/2026	04/08/2026	05/08/2026	06/08/2026

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le catture rilevate dalle trappole a feromone risultano di entità medio-alta. In diversi areali il livello di infestazione (presenza di uova e/o larve attive) ha raggiunto o superato la soglia di intervento, mentre in altri si registrano valori prossimi a tale limite. Si ricorda che la soglia consigliata per il controllo della Mosca dell'olivo è compresa tra il 3% e il 5% di infestazione attiva.

Si raccomanda pertanto di effettuare un trattamento fitosanitario a base di acetamiprid per il controllo delle uova e delle larve. Per ridurre l'attività degli adulti e contenere i voli della Mosca dell'olivo, si consiglia di intervenire con un trattamento a base di spinosad.

Per le aziende condotte in regime di agricoltura biologica, si raccomanda di effettuare un trattamento a base di azadiractina per contenere i voli degli adulti, in abbinamento a un trattamento a copertura meccanica con caolino (es. Manisol), utile a proteggere le drupe dagli attacchi dei fitofagi e a mitigare gli effetti dei colpi di calore.

Qualora vi siano dubbi sull'effettiva entità dell'infestazione nel proprio oliveto, è possibile consegnare ai tecnici un campione di 50-100 olive per consentire una valutazione più approfondita della situazione fitosanitaria.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si invitano i soci a contattare i tecnici di riferimento.