


BOLLETTINO FITOPATOLOGICO N° 04

MONITORAGGIO TIGNOLA DELL'OLIVO

PERIODO DI VALIDITA':

11/07/2026 - 18/07/2026



COMPENSORIO - ABRUZZO PRIMA COLLINA LITORANEA

MONTEODORISIO
PAGLIETA
POLLUTRI
RIPA TEATINA
TORREVECCHIA TEATINA
CEPAGATTI
COLLECORVINO
ELICE
LORETO APRUTINO
MOSCUFO

PENNE
PIANELLA
ROSCIANO
MORRO D ORO
MOSCIANO SANT ANGELO
NOTARESCO
SANT Omero

STADIO FENOLOGICO	CATTURE (MEDIA/TRAPPOLA)	OLIVE INFESTATE %	SOGLIA DI INFESTAZIONE	TENDENZA	LIVELLO DI CRITICITA'
INDURIMENTO DEL NOCCIOLO	8	0	10%	MIGLIORAMENTO	BASSO

PREVISIONI METEO

11/07/2026	12/07/2026	13/07/2026	14/07/2026	15/07/2026	16/07/2026	17/07/2026

SUGGERIMENTI FITOSANITARI

Le catture rilevate sulle trappole a feromone risultano in diminuzione. Il livello di infestazione (presenza di uova e/o larve) evidenzia anch'esso una progressiva diminuzione. Considerando l'attuale fase fenologica dell'indurimento del nocciolo, si può ritenere concluso il periodo di infestazione della Tignola dell'olivo e contestualmente inizia la fase di monitoraggio della mosca olearia attraverso il posizionamento delle trappole a feromone ed al campionamento delle drupe.

Si consiglia in questa fase di effettuare un trattamento a "copertura meccanica" con caolino (es. Manisol) utile a proteggere le drupe dagli attacchi dei fitofagi ed a mitigare gli effetti dei colpi di calore durante il periodo estivo.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti, si invitano i soci a contattare i tecnici di riferimento.